

EC FERTİLİZER
KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
(Damlama veya Yağmurlama Sulama Şeklinde Uygulama İçin)
CALPOWER-B

Garanti Edilen İçerik	% W/W
Toplam Azot (N)	8
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	15
Suda Çözünür Bor (B)	0,2

ÜRETİCİ FİRMA
SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
AHMEDİYE MAHALLESİ DAĞDIBİ SK. NO:68 ARİFİYE/SAKARYA
TEL: 0 264 228 1837 FAKS: 0 232 799 03 56
www.supersol.com.tr

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde veya kullanımdan sonra bol su ile yıkayınız. Yutmayınız, yutulması halinde, doktora başvurunuz. Çocuklardan, gıdalardan uzak tutunuz. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.

Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Ürünü, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, +4° C / 40° C arasında depolayınız. Ürünü, ağzı açık bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.



Bakanlık Lisans No: 2222

Bakanlık Tescil No:

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur.

Ürün parti No:

Hacim:

Net Ağırlık:

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Ahmediye Mah.Dağdibi Sokak No:66
Arifiye/SAKARYA
Gümrükönü V.D. 784 056 22 64
Mersis No: 0784 0569 2640 0001

Durmuş DEMİREL
Genel Müdür 1/3

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU (TOPRAKTAN)
Tüm Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan vb.)	1- Fide dikiminden 1 hafta sonra 2-İlk çiçeklenmede 3-İlk meyve dökümü sonrası	1-2 lt/da
Tüm Açık Alan Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana vb.)	1-Fide dikiminden 1 hafta sonra 2-İlk çiçeklenmede 3-İlk meyve dökümü sonrası	0,5-1 lt/da
Tüm Yumrukluk Bitkilerde (Ş. Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç vb.)	1- Gerçek yaprak oluşumundan sonra 2- Gelişme döneminde	0,5 lt/da
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Ayva, Armut vb.)	1-Çiçeklenme başlangıcında 2-Meyve tutumundan 15 gün sonra 3-Gelişme Döneminde	2-3 lt/da
Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları (Kiraz, Şeftali, Kayısı vb.)	1-Çiçeklenme başlangıcında 2-Meyve tutumundan 15 gün sonra 3- Gelişme Döneminde	2-3 lt/da
Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Antep fıstığı, Ceviz, Fındık, Badem v.b.)	1-Çiçeklenme başlangıcında 2-Meyve tutumundan 15 gün sonra 3- Gelişme Döneminde	1-2 lt/da
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina vb.)	1-Çiçeklenme öncesinde 2-Meyve tutumundan 15 gün sonra 3- Gelişme Döneminde	2-3 lt/da
Tropikal Meyveler (Muz, avokado, mango vb.)	1-Fide/Fidan Dikiminden Sonra 2-Çiçeklenme/Doğum Öncesi 3- Gelişme Döneminde	1-2 lt/da
Bağ ve Zeytin	1-Çiçeklenme öncesinde 2-Meyve tutumundan sonra 3-Gelişme Döneminde	1-2 lt/da
Tarıla Bitkileri (Buğday, Arpa, Pamuk, Mısır, Soya, Çeltik vb.) ve Yeşil Alanlar	1-Bitki boyu 10-15 cm. olunca 2-Gelişim Döneminde	0,25-0,5 lt/da

Tüm dozlar için verilmiş miktarlar ortalama değerlerdir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve tekstür değerine göre doz miktarı değişkenlik gösterir. Üreticilerin kullanacakları ürün miktarını belirlemeleri için mutlaka toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak ürünü kullanmaları tavsiye edilir.

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı Kanun'a göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ
Ahmediye Mah. Dağdibi Sok. No: 10
Arifiye/SAKARYA
Gümrük No: 0784056
Mersis No: 0784 0569 2640 2/3

Durmuş DEMİR
Sakarya